

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante–MB–5EO II

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar; cuando sea necesario, los leucocitos se tiñen antes de la clasificación y el recuento de células, o se realiza directamente la clasificación y el recuento de células y/o la determinación cuantitativa de hemoglobina



Foto del Producto

Modelo del Producto	Reactivo Hemolizante–MB–5EO II
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1315

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar; cuando sea necesario, los leucocitos se tiñen antes de la clasificación y el recuento de células, o se realiza directamente la clasificación y el recuento de células y/o la determinación cuantitativa de hemoglobina

Principio

Lisa los glóbulos rojos manteniendo inalterada la morfología de los leucocitos...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.

