

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-MB-5EO I

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser; si nécessaire, les leucocytes sont colorés avant la classification et la numération des cellules, ou la classification et la numération des cellules et/ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine sont réalisés directement



Photo du Produit

Modèle du Produit	Réactif Hémolysant-MB-5EO I
Spécifications d'Emballage	500 mL, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L
Code Produit	p1312

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser; si nécessaire, les leucocytes sont colorés avant la classification et la numération des cellules, ou la classification et la numération des cellules et/ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine sont réalisés directement

Principe

Il lyse les globules rouges en maintenant intacte la morphologie des leucocytes...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.

